



## باسفوليار 34 إس إل

سماد سائل يحتوي على نسبة عالية من النيتروجين ومدعم بالنحاس والمنجنيز

المورد: كومبو إكسبرت

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات الأسمدة - مغذيات ورقية

### التركيب

| المكوّن            | النسبة  | المصدر                |
|--------------------|---------|-----------------------|
| نيتروجين           | 34%     | نترات أمونيوم + يوريا |
| نحاس               | % 0.128 | Cu - EDTA             |
| منجنيز             | % 0.128 | Mn - EDTA             |
| مادة مخلبية (EDTA) | % 1.5   | -----                 |

### التعريف

سماد ورقى سائل عالي النيتروجين بنسبة 34% وزن/حجم - في ثلاثة صور شكل نترات أمونيوم ويوريا مكمل بالنحاس والمنجنيز المخلبين بواسطة مادة إدتا لتعطي مدى تأثير سريع وممتد المفعول ومناسب للرش الورقي والتسميد الأرضي

### الخصائص والمميزات

- يعالج ويمنع أعراض نقص عنصر النيتروجين ويمنع التأثير السام للبيوريت المسبب لإحترق الأوراق .
- يمتص بكفاءة عالية عن طريق الأوراق ويعمل على رفع المحتوى البروتيني للأوراق .
- يعمل على تحسين النمو الخضري بعد الخروج من السكون أو بعد جمع المحصول أو بعد ظروف الإجهاد المختلفة وزيادة البروتينات الضرورية لبداية الموسم في فترة بسيطة ويشجع إستطالة النبات ومناسب للرش والتسميد .

## معدلات الاستخدام

درجة حموضة PH في محلول الرش - (0.5 : 6.6) يرش جيداً قبل الاستخدام

| المحصول                           | معدلات الرش        | طريقة ووقت الاستخدام                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموالح                           | 1.5 : 2 لتر/الفدان | خلال فترة النمو الخضري وبداية تكوين الثمار حيث يحسن من قشرة وخصائص وجودة الثمار                                                           |
| العنب                             | 1 لتر / الفدان     | من بداية تكوين العناقيد وحتى بداية تلوين الثمار                                                                                           |
| الفراولة                          | 1 : 2 لتر/الفدان   | رشتين لكل إضافة، الأولى عند وصول النبات لإرتفاع 15 سم والثانية بعدها بأسبوعين، والإضافة وقت ظروف الإجهاد مفضلة نظراً للحاجة إلى النتروجين |
| أشجار الفاكهة وذات النواة الحجرية | 2 لتر/الفدان       | تقسم على دفعات خلال فترة نمو الثمار بداية من مرحلة عقد الثمار وحتى 2 : 3 أسابيع قبل الحصاد                                                |
| الزيتون                           | 1.5 لتر / الفدان   | من بداية النمو في الشتاء وحتى قبل مرحلة التزهير ومن 2 : 3 رشات من بداية النمو وحتى تصلب الثمرة                                            |
| الطماطم والبطاطس                  | 1 : 1.5 لتر/الفدان | رشتين الأولى عند وصول النبات لإرتفاع 15 سم والثانية بعدها بأسبوعين والإضافة وقت ظروف الإجهاد مفضلة نظراً للحاجة إلى النتروجين             |
| البصل والثوم                      | 1 لتر/الفدان       | رشتين لكل إضافة الأولى بعد أسبوع والثانية بعد شهر                                                                                         |
| بنجر السكر                        | 1 لتر/الفدان       | 5 : 7 لتر/الفدان الرش في الفترة ما بين تكوين الورقة الرابعة إلى السادسة                                                                   |
| محاصيل الحبوب                     | 1 لتر / الفدان     | خلال مرحلة الاستطالة والنمو الخضري وبعد التزهير ويوصى بالرش لتشجيع النمو وخاصة في الشتاء وتكرر بعد التزهير لزيادة محتوى البروتين          |

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائماً وفقاً للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

## قابلية الخلط

متوافق مع معظم مبيدات الآفات الأكثر استخداماً. يراعى عمل تجربة إسترشادية قبل الاستخدام