



باسفوليار كالسيوم إس إل

مغذيات ورقية – كالسيوم 23.6%

المورد: كومبو إكسبرت

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات الأسمدة – مغذيات ورقية

التركيب

المكوّن	النسبة
كالسيوم	23.6%

التعريف

سماد سائل معدني معقد عالي الجودة من الكالسيوم عالي الذوبان في الماء مما يسهل إمتصاصه ولا يرفع قلوية التربة عند الحقن فهو مناسب للتربة الحساسة وأكثر أماناً ويخفف الإجهاد الملحي ويستخدم في الرش الورقي أو التسميد الأرضي لتوفير كالسيوم سريع الإمتصاص كوقائي وعلاجي لمنع ظهور أعراض نقص الكالسيوم خاصة على الثمار

الخصائص والمميزات

- باسفوليار® كالسيوم إس إل يتميز بأنه خالي تماماً من النيتروجين مما يتيح إستخدامه في المراحل المتأخرة من التحجيم لزيادة تحسين جودة الثمار دون وقوع أي تأثير على الثمار ويمكن إستخدامه أول مرحلة العقد فيزيد من إنقسامات الخلايا وكذلك يعمل على تقليل حدوث إنفصال الأزهار والثمار بعد العقد. وضروري لإستمرار نمو القمم المرستيمية المسئولة عن النموات الحديثة.
- باسفوليار® كالسيوم إس إل له تأثير فعال وسريع لما يتميز به من سرعة إمتصاص عنصر الكالسيوم مما يسهل إختراقه لخلايا النبات ويساعد على تراص مثالي للعنصر داخل الخلايا مما يزيد من صلابة الثمار وزيادة تحملها لعمليات النقل والتخزين وللأمراض الفسيولوجية الناتجة عن نقص العنصر
- باسفوليار® كالسيوم إس إل يمنع ظهور عفن الطرف الزهري في الطماطم وبقع الأوراق الفسيولوجية وسقوط الأوراق المبكر ويقلل من تحول لون الجلد واللحم إلي اللون البني Bitter pit في التفاح .
- باسفوليار® كالسيوم إس إل يساعد على سرعة نقل الكربوهيدرات والأحماض الأمينية ويساعد في بناء البروتينات وإمتصاص النترات لعدم قدرة النبات على إختزال النترات إلي أمونيا بأنسجتها في عدم وجود الكالسيوم.
- باسفوليار® كالسيوم إس إل يلعب دوراً هاماً في تحمل النباتات للظروف الجوية المعاكسة مثل إرتفاع درجة الحرارة والصقيع وكذلك التعرض المفاجئ للجفاف ويمد النبات بالكالسيوم في ظروف الإجهاد التي يقل فيه إمتصاص الكالسيوم خاصة في التسميد لمركبات أخرى .

معدلات الاستخدام

- يرج جيداً قبل الإستخدام
- الرش الورقي : بمعدل 150 : 250 سم³ / 100 لتر ماء
- التسميد الأرضي : بمعدل 1 : 2 لتر للفدان حسب نوع المحصول وعمر النبات .

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائماً وفقاً للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

يمكن خلطه مع معظم المبيدات الجهازية ومنظمات النمو وتترات البوتاسيوم فيعمل على تحسين إمتصاصها مع التركيزات المنخفضة وتجنب خلطه مع الكبريتات والنحاس والفوسفور ويراعى ضبط درجة الحموضة بين (6 : 7) عند الخلط مع المبيدات لضمان الاستقرار وعمل تجربة إسترشادية خلط قبل التطبيق .