



## براندت برومينو V

منشط للنمو ومضاد للإجهاد

المورد: براندت أوروبا

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات الأسمدة — مغذيات ورقية

### التركيب

| النسبة | المكون                        |
|--------|-------------------------------|
| 15%    | أحماض أمينية حرة (مصدر نباتي) |
| 1.15%  | زنك                           |
| 1.15%  | منجنيز                        |

### التعريف

محفز حيوي مزدوج الكفاءة سائل غني بالنيتروجين العضوي حيث يحتوي على عدد كبير من الأحماض الأمينية الحرة الطبيعية وبيبتيدات بنسبة مثلى بين البيبتيدات الطويلة والقصيرة السلسلة ( مستخلصة بواسطة الأحماض العضوية وليست المعدنية ) كمضاد للإجهاد وتخليب ( الزنك والمنجنيز ) مما يزيد سرعة الإمتصاص  
 فيجمع بين تنشيط النمو ومضاد للإجهاد في أول مراحل النمو أو بعد إجهاد المحصول أو الإجهادات البيئية المختلفة

### الخصائص والمميزات

- براندت برومينو V سماء سائل غني بالأحماض الأمينية حيث يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الحرة الطبيعية أكثر من 17 حمض أميني ويحتوي على الزنك والمنجنيز في صورة سهلة الإمتصاص .
- براندت برومينو V يزيد من تكوين البروتين والكربوهيدرات لذا له تأثير منشط للنمو ومضاد للإجهاد لإحتوائه على الأحماض الأمينية الحرة. يستخدم خلال المراحل الحرجة من نمو أشجار الفاكهة والخضر والمحاصيل الحقلية خاصة تنشيط النمو قبل الإزهار ثم أثناء الإزهار وعقد الثمار وأخيرا بعد خف الثمار وخلال مرحلة تحجيم الثمار والحبوب.

## معدلات الاستخدام

يستخدم رشاً ويكرر 3-4 مرات كما هو موضح

| المحصول                               | مرحلة التطبيق                                                                      | المعدل لكل 100 لتر ماء  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الموالح                               | - أسبوعين قبل نمو الأفرخ وعند عقد الثمار - مرحلة تحجيم الثمار                      | 200 سم <sup>3</sup>     |
| الموز والزيتون                        | - بدء النمو الخضري وعند التزهير و تحجيم الثمار                                     | 200 سم <sup>3</sup>     |
| التفاح والخوخ والمشمش والبرقوق والعنب | - بدء النمو الخضري وعند التزهير وبعد خف الثمار ( بداية التحجيم )                   | 200 سم <sup>3</sup>     |
| الفراولة                              | - بعد 15 يوم من الشتل وبدء النمو الخضري - قبل التزهير ويكرر اثناء نمو وتطور الثمار | 200 سم <sup>3</sup>     |
| محاصيل الخضر                          | - بدء النمو الخضري وقبل التزهير وتحجيم الثمار                                      | 100-200 سم <sup>3</sup> |
| البرسيم                               | بعد الحشات عند طول نموات 10-12 سم                                                  | 100-200 سم <sup>3</sup> |
| القطن                                 | - عند بداية التزهير ويكرر بعد شهر من التزهير                                       | 100-200 سم <sup>3</sup> |

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائماً وفقاً للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

## قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات الحشرية والفطرية ولا يقبل الخلط مع المركبات شديدة القلوية.