



دوجر بيكر WP%85

مبيد فطري نحاسي – أوكسي كلور نحاس 85%

المورد: استرانوفا تاريم

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات – مبيدات فطرية

المادة الفعالة

المكون

النسبة

أوكسي كلوريد النحاس

WP 85%

التعريف

مبيد فطري وبكتيري يعمل باللامسة وهو مسحوق قابل للبلل جيد الانتشار والإلتصاق على المزروعات المعاملة به وله تأثير وقائي وعلاجي قبل نمو الجراثيم الفطرية والأمراض البكتيرية والتبقعات والتقرحات والجرب للتفاحيات وتجعد الأوراق والثقوب النارية في الخوخ .

الخصائص والمميزات

- مبيد فطري فعال واسع المدي يستعمل وقائيا لمقاومة مجموعة كبيرة من الأمراض الفطرية والتي تصيب كثير من المحاصيل و الخضر والفاكهة مانعاً إنبات جراثيم الفطريات وبالتالي عدم حدوث الإصابة به
- مسحوق قابل للبلل جيد الانتشار والإلتصاق علي المزروعات المعاملة به مما يوفر حماية أطول ضد مسببات الأمراض و ليس له تأثير علي الكائنات النافعه ومنها نحل العسل.
- يتميز بفاعليته ضد مجموعة واسعة من الفطريات والبكتيريا التي تصيب النباتات مثل اللبحة المتأخرة في البطاطس والطماطم البياض الزغي في الخضروات والجرب والتبقعات في أشجار الفاكهة
- يحقق حماية للمحصول من الإصابة بمدي واسع من مسببات الأمراض الفطرية والبكتيرية عن طريق عمل طبقة على سطح النبات تمنع دخول الفطريات والبكتيريا للأنسجة النباتية
- يتميز بكونه غير جهازي , صديق للبيئة , ومعتد في الزراعة العضوية .

معدلات الاستخدام

يفضل إستخدامه في الصباح الباكر أو عند إنخفاض درجات الحرارة لتجنب تأثير الشمس الحارقة

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	المرض	معدل الإستخدام	PHI
الموالح	الأشنة	300 جم / 100 لتر ماء	15 يوم

التوصيات العالمية

المحصول	المرض	معدل الإستخدام
البطاطس والطماطم	الندوة المبكرة - الندوة المتأخرة	250-300 جم / 100 لتر ماء
البصل والثوم	الصدأ واللطة الأرجوانية	250 جم / 100 لتر ماء
العنب	البياض الزغبي	250 جم / 100 لتر ماء
الموالح	العفن الهبائي وموت الأطراف والأشنات	250-300 جم / 100 لتر ماء
المانجو	لفحة الأزهار وموت الأطراف والعفن الهبائي	250-300 جم / 100 لتر ماء
الخوخ والمشمش	تجدد الأوراق والثقوب النارية	250 جم / 100 لتر ماء
التفاح والكمثرى	الجرب	250 جم / 100 لتر ماء

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائماً وفقاً للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

يراعى عمل تجربة خلط قبل الإستخدام ولا يفضل الخلط مع الأحماض الأمينية لتجنب زيادة إمتصاص النحاس بنسب كبيرة مما يؤدي لحدوث تسمم في النبات

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: نحاس معدني