



دروتل 72.2% SL

مبيد فطري – بروباموكارب هيدروكلوريد 72.2 %

المورد: أجريساينسز تاريم

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات – مبيدات فطرية

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
بروباموكارب هيدروكلوريد	72.2 % SL

التعريف

مبيد جهازي (وقائي وعلاجي) يؤثر على فطريات الندوة المتأخرة والبياض الزغي على مختلف المحاصيل

الخصائص والمميزات

- يتميز بخاصية جهازية ممتازة توفر حماية متكاملة للنبات :-
- حركة جهازية تصاعدية :عند حقن المركب ينتقل بسرعة من الجذور عبر الخشب للساق والأوراق
- تأثير وقائي وعلاجي : يمنع إختراق الفطر للنبات وتأثير علاجي قادر على إيقاف الإصابة الأولية
- يمكن إستخدامه عدة مرات دون أن تتكون مقاومة لدى المسبب المرضي علاوة على أنه يمتص جهازياً ويحقق نتائج ممتازة ولا يمكن غسله بالأمطار او عن طريق الري بنظام الرش الثابت
- يجب الرش عند توقع الإصابة وملائمة الظروف المناخية وحتى بعد ظهور نسبة منخفضة من الإصابة
- له تأثير قوي على الفطريات التي تكون عندها مقاومة لمركبات أخرى لتمييزه بإزدواجية التأثير .
- يمنع إصابة النباتات بالفطريات المسببة لتعفن الجذور والذبول مثل البيثيوم والفيتوفثورا

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	المرض	معدل الاستخدام	PHI
الخيار	البياض الزغبي	250 سم ³ / 100 لتر ماء	5 أيام

التوصيات العالمية

المحصول	المرض	معدل الاستخدام
البطاطس	الندوة المتأخرة	250 سم ³ / 100 لتر ماء
الطماطم	الندوة المتأخرة	250 سم ³ / 100 لتر ماء
العنب	البياض الزغبي	250 سم ³ / 100 لتر ماء

- غمر جذور الشتلات قبل الزراعة في محلول بتركيز 250 سم³ / 100 لتر ماء لمدة 15:10 دقيقة
- حقن في الري بالتنقيط بمعدل 1.5 : 2 لتر / فدان

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

يقبل الخلط مع معظم المبيدات والمغذيات ويراعى عمل تجربة خلط قبل الاستخدام

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: كاربامات Carbamate