



داستر 5% EC

مبيد أكاروسي للبيض واليرقات

المورد: أجريساينسز تاريم

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات – مبيدات أكاروسية

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
هيكسيثيازوكس	EC 5%

التعريف

مبيد عناكي عالي الفعالية يعمل باللامسة وله خاصية جهازية موضعية يقضي على بيض ويرقات وحوريات العناكب

الخصائص والمميزات

- داستر مبيد عناكي عالي الفعالية يعمل باللامسة وعن طريق الجهاز الهضمي وله خاصية جهازية موضعية من خلال نفاذه من أسطح الأوراق. مقاوم لغسيل الأمطار وذو تأثير طويل الأمد يستمر من 28-45 يومًا.
- داستر يقضي على بيض ويرقات وحوريات العناكب، ولا يؤثر على الطور البالغ.
- داستر فعال بشكل مميز للقضاء على الحلم والعنكبوت الأحمر وذو النقطتين والصدأ.
- داستر صديق للمفترسات والطفيليات واللافقاريات ويمكن استخدامه في برامج مكافحة متكاملة.

معدلات الاستخدام

- ثباتية المبيد في محلول الرش على درجة حموضة (5 : 6)
- له فعالية شديدة عند استخدامه قبل ظهور الأطوار البالغة وعندما تكون الإصابة شديدة يجب خلطه مع مبيد للعناكب البالغة.

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	PHI
العنب	العنكبوت الاحمر	50 سم ³ / 100 لتر ماء	7 أيام للأوراق 3 أيام للثمار
الفاول السوداني	العنكبوت الاحمر	40 سم ³ / 100 لتر ماء	7 أيام

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	PHI
الموالح	أكاروس الموالح البني	40 سم ³ / 100 لتر ماء	7 أيام
الطماطم والباذنجان والخيار والبطيخ	الحلم , العنكبوت الأحمر, العنكبوت ذو النقطتين	40 سم ³ / 100 لتر ماء	7 أيام
التفاح	العنكبوت الأحمر	40 سم ³ / 100 لتر ماء	14 يوم
الفراولة	العنكبوت الأحمر	40 سم ³ / 100 لتر ماء	3 أيام

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية الشائعة ولا يخلط مع المركبات القلوية .

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: داي فينيل أوكسازولين (Diphenyl Oxazoline)