



فيستالون 80%WG

مبيد فطري جهازى مزدوج التأثير

المورد: ليمين كيميكال

الشركة المستوردة: أجرى سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات - مبيدات فطرية

المادة الفعالة

المكوّن

النسبة

WG 80%

فوستيل ألومنيوم

التعريف

مبيد فطري جهازى (وقائى وعلاجى) ويختلف عن مركبات الفوسفور العضوية. ويتميز بخاصية فريدة ونادرة تعرف بالجهازية الكاملة ثنائية الاتجاه حيث تنتقل صعوداً عبر الخشب وهبوطاً عبر اللحاء مما يسمح وصولها للجذر بالرش

الخصائص والمميزات

- مبيد فطري ذو تأثير جهازى يقضى على طيف واسع من الفطريات التي تستهدفها المادة الفعالة والتي منها:
- الألترياريا والفيثوفثورا اللذان يسببان الندوة المبكرة والمتأخرة على البطاطس والطماطم. بلازموبارا وبريميا اللذان يسببان أمراض البياض الزغبي في العنب والبياض الزغبي في الخيار . بيثيوم والذي يسبب عفن البذور والجذور وموت البادرات. والمركب له تأثير ممتد يمنح حماية وقائية طويلة الأمد (14 : 21) يوم
- يستخدم لمكافحة التصمغ في الموالح وأعفان الجذور على أشجار الفاكهة وعفن البرعم في النخيل .
- يتميز بتأثير قوى جانبي لبعض البكتيريا مثل المسببة للفة النارية

معدلات الاستخدام

يراعى ضبط درجة حموضة محلول الرش (5.5 : 6.5)

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	المرض	معدل الاستخدام	PHI
الخيار	البياض الزغبي	250 جم / 100 لتر ماء	7 أيام

التوصيات العالمية

المحصول	المرض	معدل الاستخدام
البطاطس والطماطم	الندوة المبكرة والندوة المتأخرة	250 جم / 100 لتر ماء
الموالح	التصمغ	500 جرام / الفدان حقن
الطماطم	أعفان الجذور وموت البادرات	500 جرام / الفدان حقن

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

لا يقبل الخلط مع المواد القلوية كالنحاس والكبريت والمغذيات النيتروجينية أو الأحماض الأمينية أو العناصر المركزة مثل الزنك والمغنسيوم ويراعى ترك فاصل زمني 7 : 10 أيام بين رشه وأي مركب نحاسي

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: الفوسفونات Phosphonate