



ستوريون 40% EC

مبيد نيماتودي جهازى وبالملاسة

المورد: أجريساينسز تاريم

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات - مبيدات نيماتودا

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
فيناميفوس	40%

التعريف

مبيد نيماتودي فوسفوري عضوي جهازى وبالملاسة للقضاء على العديد من أنواع النيماتودا المختلفة

الخصائص والمميزات

- ستوريون : مبيد نيماتودي جهازى يعمل بالملاسة يمتص من الجذور وينتقل للأوراق له تأثير متبقي طويل الأمد
- ستوريون : ينتشر بسرعة في التربة ولا يتحلل بسهولة في الماء ولكن يتحلل بسرعة كبيرة عند تعرضه للضوء
- ستوريون : له تأثير فعال في مكافحة النيماتودا سواء الخارجية أو الداخلية و النيماتودا المتحوصلة ونيماتودا تعقد الجذور
- ستوريون : له تأثير جانبي علي الحشرات الماصة والعناكب وحشرات التربة

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	فترة ما قبل الحصاد (phi)
الموالح	نيماتودا التدهور البطيء	3 لتر / الفدان	30 يوم

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	فترة ما قبل الحصاد (phi)
العنب	نيماتودا تعقد الجذور	2.5 لتر / الفدان	60 يوم
الموز	نيماتودا تعقد الجذور	12 سم ³ / جورة	7 أيام
بنجر السكر	نيماتودا تعقد الجذور	3 لتر / الفدان	45 يوم
البطاطس	نيماتودا تعقد الجذور	2.5 لتر / الفدان	42 يوم

فترة تكسير المبيد : يتكسر 50 % من المبيد في التربة جيدة التهوية خلال 7 : 15 يوم ولا تتأثر بنسبة الرطوبة أو الحرارة

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

لا يخلط المبيد مع المبيدات والأسمدة الأخرى ويمكن إجراء تجربة قبل أو بعد استخدام المبيد.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: الفوسفور العضوي Organophosphorus