



تري ست

سماد متخصص لعقد الثمار بدون إجهاد

المورد: فوتوريكو بايوساينس

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات الأسمدة — مغذيات ورقية

التركيب

النسبة	المكوّن
5%	أحماض أمينية حرة (مصدر نباتي)
8%	زنك (Zn)
3.8%	بورون معدني (B)
0.5%	نحاس (Cu)
5%	لاكتوز مونهيدرات
59%	حمض الهيبتاجلوكونيك (مادة معقدة)

التعريف

محفز حيوي يحتوى على كميات عالية من الأحماض الأمينية النباتية الحرة والزنك والبورون والتي تعمل على تحسين التزهير والعقد لزيادة إنتاجية المحاصيل بدون إجهاد وخاصة للنباتات بعد إجهاد المحصول أو الإجهادات البيئية المختلفة

الخصائص والمميزات

- تري ست يحتوي على أحماض أمينية حرة مستخلصة من تخمير بروتينات نباتية بواسطة بكتيريا Bravebacterium sp وهي كالتالي :
(برولين وجلوتاميك وجلايسين وألانين وأرجنين وهيسستين وفينيل ألانين وفالين وأسبارتيك وليسين ...
- تري ست توفر هذه التركيبة بيئة غذائية وهرمونية متوازنة تدعم تكوين ثمار متجانسة وتحسين جودة المحصول
- والبرولين يعمل على زيادة مقاومة الإجهاد وتوازن الإسموزية وتكوين مضادات الأكسدة
- تحفيز التزهير والعقد : يعزز وجود الزنك تكوين التريبتوفان وهو أساس تكوين الأوكسين النباتي كما يدعم البورون إنتاج الأوكسين وإستقراره ونقله داخل الأنسجة النباتية ويعزز هذا التفاعل الغذائي والهرموني نمو أنبوب اللقاح ونجاح العقد ويساهم النحاس في النشاط الإنزيمي المرتبط بالتنفس وتفاعلات الأكسدة والإختزال فيحسن حيوية حبوب اللقاح
- دواعى الإستخدام :
- يوصى بإستعماله في مرحلة ما قبل التزهير مما يعزز خصوبة الأزهار وزيادة نسبة العقد وتحسين الإنتاج وجودته كما يساعد النبات على مقاومة الظروف البيئية المعاكسة .

معدلات الاستخدام

الرش الورقي

بمعدل 100 : 150 جرام / 100 لتر ماء - التسميد الأرضي : بمعدل 0.5 : 1 كيلو جرام / فدان قابلية الخلط : يوصى بإجراء اختبار خلط قبل استخدام أي خليط مع هذا المنتج.

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائماً وفقاً للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.