



في سترو 35% SC

مبيد حشري جهازي – إيميداكلوبريد 35%

المورد: تاجروس كيميكا

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات – مبيدات حشرية

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
إيميداكلوبريد	SC 35%

التعريف

مبيد حشري ذو فعالية جهازية فائقة وبالملازمة وبالبلع يكافح العديد من الآفات الحشرية ، يحقق توزيعًا مثاليًا داخل أنسجة الأوراق المعاملة. يقضي على الحشرات الثاقبة الماصة التي تتغذى على محتويات الورقة الداخلية من كلا السطحين العلوي والسفلي، فيتوقف الضرر وتموت الحشرات في النهاية.

الخصائص والمميزات

- سريع الامتصاص والانتقال داخل أنسجة النبات المعامل، ومتوافق مع برامج مكافحة المتكاملة.
- صديق للبيئة في حالة المعاملة الأرضية، ويحافظ على الأعداء الحيوية، وآمن للإنسان والحيوان.
- ممتد المفعول وبكفاءة عالية ولا تتأثر فاعليته بدرجات الحرارة والرطوبة، ولا يغسل بالمطر.
- تأثيره فعال على الحشرات التي اكتسبت صفة المناعة من المركبات الأخرى.
- يساعد في الحصول على محصول خالٍ من الأمراض الفيروسية وذو جودة مرتفعة، ومناسب في التصدير.

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة المصرية

المحصول	المرض	معدل الإستخدام	PHI
الطماطم	الذبابة البيضاء	50 سم ³ / 100 لتر ماء	7 أيام

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام
العنب و الموالح	صانعات الأنفاق، البق الدقيقي، الحشرات القشرية	75 سم ³ / 100 لتر ماء : 350 سم ³ / فدان حقناً
البصل	التريس	250 سم ³ / فدان.
الخضروات	المن، الذبابة البيضاء، التريس و صانعات الأنفاق	100-125 سم ³ / 100 لتر ماء
الخوخ / المشمش	المن، الجاسيد	100 سم ³ / 100 لتر ماء
النخيل	سوسة النخيل الحمراء، الحشرات القشرية	20-30 سم ³ / نخلة
بنجر السكر	ذبابة البنجر	300 سم ³ / فدان

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائماً وفقاً للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: نيونيكوتينويد - (Neonicotinoid)