



اكزاراتور SG%50

مبيد حشري جهازي مانع التغذية

المورد: اجريسماينسز تاريم

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات – مبيدات حشرية

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
فلونيكاميد	SG % 50

التعريف

مبيد حشري جهازي مانع التغذية حديث متخصص الفعالية لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة عامة، وبصفة خاصة المن بكل أنواعه وأطواره، بالإضافة إلى الذبابة البيضاء، والترس، الجاسيد، والبق الدقيقي، والحشرات القشرية

الخصائص والمميزات

- مبيد حشري حديث مانع للتغذية : للمن والحشرات الثاقبة الماصة تتميز بتأثير سريع مثبط للتغذية خلال نصف ساعة بعد المعاملة بدون أعراض، وبدون احتمالات الشفاء حتى الموت. ونسبة الإبادة عالية في الحوريات حديثة الولادة بعد تعرضها للمبيد وتموت جوعاً خلال 2 : 5 أيام وعند خلطها مع الدلتامثرين 5% يحقق تأثير مزدوج جهازي للحشرات الثاقبة الماصة والتأثير الصاق للديدان والحشرات القارضة .

- إيقاف نقل الفيروسات : لتأثيره السريع على المن لتأثيره الجهازي سريع الإمتصاص والإنتقال داخل النبات
- كسر المقاومة : تأثيره فعال على الحشرات التي أكتسبت صفة المناعة من المركبات الأخرى
- مقاومة الغسيل بالمطر : لا تتأثر فعالية المادة بالمطر مما يضمن إستمرار الحماية للنبات
- فترة حماية ممتدة : ممتد المفعول وبكفاءة عالية على العديد من المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة
- تركيبة مميزة : يتميز بصورته المنفرد بها عن أي مركب آخر التي هي عبارة عن حبيبات قابلة للذوبان في الماء

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	PHI
البطاطس	المن	20 جم / 100 لتر ماء	14 يوم

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام
البصل	التريس	80 جم / فدان رش
العنب	البق الدقيقي	20 جم / 100 لتر ماء
الموالح	الحشرات القشرية	30 جم / 100 لتر ماء
الخوخ	المن والجاسيد	20 جم / 100 لتر ماء

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: بيريدين كاربوكساميدز Pyridincarboxamids